

Avortement

L'avortement consiste dans l'interruption de la gestation avant que le fœtus ne soit viable. Il se caractérise par « Repeat Breeding » c'est-à-dire la réapparition des chaleurs après des périodes de temps accédants la durée du cycle normal (après 1, 2, 3 mois).

Etiologie : en sont les facteurs :

1. Hormonaux
2. Génétiques
3. Nutritionnels (mauvaise alimentation)
4. Hygiène
5. Environnements (froid, vent, bruit...)

L'avortement fœtal peut être total ou partiel (truie, chienne, chatte...)

Les causes peuvent être aussi d'origines infectieuses (bactéries : Brucellose, virus, parasites) et d'origines non infectieuses ou sporadiques, par exemple : chute traumatique (travail forcé), effort prolongé de la jument, aliment avarié, certains médicaments...

L'avortement est fréquemment compliqué par de rétention d'arrière faix (membranes fœtales). Il peut aussi se produire après un accouchement normal. La rétention de membranes peut causer la métrite, empêche l'involution utérine et cause la stérilité.

Traitement

1. Délivrance manuelle pratiquée lorsque l'accouchement date de moins de 48 heures.
2. Lutter contre les infections en introduisant les oblets utérines qui sont à base d'antibiotiques, sulfamides ou en injectant des antibiotiques antiseptiques.